







N° 3


latissimus wegg

ji besonder de ... ... ika it
niet anders weg



n°4




N.° 5
N.° 6
6
7
8
9
10
11
12
3
2
1




N° 1
longus


N° 1


No 2
obliqus internus komt vant os
ilium en hecht he volgsigh
in de 12 · XI · 10 · ribbe en so
al gemachlic op gaende vastet
mit her tendon an het cartelage
der 9 · 8 · 7 · 6 ribbe alsoo ant
3 borstben en des met her draet,,
achtige tendon endiget onder
rectus inde linnie Alba en
so dat he en buic rectus wolde
heyt gelic it in en schede, doch
is so verenigt dat he niet en sint
te separeren als met grotten
arbeyt
tongus
No 2


No 2
No 2
romboides
6
6
obliquus internus komt van of
ilium en hecht hem volgens
in de 12. XI. 10. ribbe en so
al gemachlic op gaende vastet
met her tenden an het cartilage
der 9. 8. 7. 6 ribbe alsoo ont
3 borstbeen en dan met her draet-
achtige tenden eindiget onder
rectus inde linea alba en
so dat se en hun rectus welke
heeft gelic it in en scheeden, doch
is so vereniget dat se niet en sint
te separeren als met groten
arbeyt
longus
No 2


N° 3
b
b
b sacrolumbus
c dors long
N° 3
transversus is aan de 12
onderste ribbes vaste en
niet ant cartolagio


b sacrolumbus
c dors long
N° 3
transversus is ande
underste ribbe vaste en
niet aen cartilagio
N° 3


N° 4
rotondus Major
a latissimus
N° 4
a dorsi longissimus
b . sacro lombus
γ het tweede deel sacrolumbus



N° 4
a dorsi longissimus
b sacro lumbus
c het tweede deel sacrolumbus
N° 4
41



No 6
R nerüosus supinator
K dünbüger
q quadratüs
i folexor carpi int
N profondüs
b longior supinator
rotondus pronator
o suplimus
N profündus
T bicornis
S cubiti internus
W cubiti externus



Nº 5
Nº 6
Nº 6



N° 7
N° 8
rotonduss pronator
S. cubiti internus 2
o. supplimuss 3
palmariss i
K. gedeltje dess dumss 6
I. felexor carpi internus 4
rotonduss pronator biceps
rotonduss pronator 5
o.. supplimuss in boven profonduss 3
K dumbugen
N profunduss 7
quadratuss 8
perforatuss 3
int scapula
latissimuss i
rotonduss Major 2
rotondu minor
cubiti externus
T bicornis
nervosus supinato
brachous internus
brachous externus
anconeus
W cubiti externus
breviss
longuss


Nº 7



die muskelen van het dyge been
a --- het vleys membranosus
g.g. --- grasillis
l --- pectineus longior
MM --- triceps kompt van voren
z --- triceps longus
εε --- triceps tweede gedelt
TT --- semi nervosus
w.w. semi membranosus
bb --- facialis
e --- vastus int
k --- crureus
r --- rectus
ℨℨ --- obturatur internus
24 --- piri formis
N --- psoas
o --- iliacus int
q --- glutaeus major
N° 1
A tibia anticus
R gemela
F gemela
F gemela
F gemela
F gemela
F gemela
B -- rechter van den tweeden litten der tehen
R -- rechter van den voorste en tweedesten leden der tehen
y -- vleys van soleus
K -- hielleste pesen van soleus
M -- buger vant voorste lit der grotten tehen
buger der 4 tehen ---- L must alte ... N, of tibia posticus
NN -- tibius posticus ... aen 24 bey den voeten maer loopt onder den voet aen 21 bey



die musculen van het dyge been
a --- het vleysch Membranosus
g.g. --- grazillis
l --- pectineus longior
MM --- triceps kompt van voren
zz --- triceps longus
εε --- triceps tweede gedeelt
TT --- semi nervosus
w.w. semi Membranosus
bb --- facialis
e --- vastus int
k --- crureus
r --- rectus
ξξ --- obturatur internus
24 --- piri formis
N --- psoas
o --- iliacus int
q --- glutaeus Major
N° i
A tibia anticus
R genuola
F geinuola
F genuola
F ginuola
F ginuela
F' ginuola
B -- rechter van den tweeden litten der teen
R -- rechter van den eersten en tweeden leden der teen
y -- vleys van soleus
K -- hielighe tendon van soleus
M -- buger vant eerste lit der grotte teen
buger der 4 teen — L rust alte mit vr N. of tibia posticus
NN -- tibius posticus schiet vaste te wesen aen 24 by den voeten maer loopt onder den voet aen 21 by



de Muskels van het dyebeen sin desse
g... grazilis
l.... pectineus longior
MM..... triceps houpt van vooren
ʒ...... triceps longior
EE....... triceps tweede gedeelt
T.-- semi nervosus
W... semi membranosus
bb.-- farialis
e... vastus inter
k... crureus
r... rectus
ʒʒ.... obturatur internus
44 .. piri formis
N ..... psoas
O ..... iliacus internus
q ... glutaeus Major
N°2
N° ~~3~~ 2
B .. regter vant tweede gelit der 3 tehen en den kleine ten vandt se het eerste gelit
A— tibia anticus
y soleus eerste
y soleus tweede
y soleus derde
G --- plantaris
H popliteus
R. regter van de grooten tehen en schiet hier gen del aut gelit van dien
NN - tibia posticus & is de onderste
L -- ~~regter~~ der 4 tehen buger
M --- buger van den grooten tehen
K --- teidon van de hiel komende ansoleus



de Mussels van het dyebeen sin desse
g... grazilis
l.... pertineus longior
M M..... triceps hoinpt van vooren
ℨ ...... triceps longer
E E .... triceps tweede gedeelt
T - - semi nervosus
w.... semi membranosus
b b. ... fascialis
e. ... vastus inter
k . ... crureus
c . .... rectus
ℨ ℨ ..... obturatur internus
4 4 - piriformis
N ..... psoas
o ..... iliacus internus
q ..... gluteus Maior
N°2
N° 2
B rechter vant tweede gelit der 3 tehen en den kleine toon vant se het vorste gelit
A — tibia anticus
y soleus exte
y soleus tweede
y soleus derde
G - - plantaris
H poplitaeus
R . rechter van de grooten toon en schiet hier gen dol aan gelit van dien
NN - tibia posticus en is de middelste
L - - ~~rechter~~ der 4 tehen buger
M - - - buger van de grooten toon
K - - - tedon van de hiel komende ansoleus



de Muscles vant dyebeen sint dese
g --- gracilis
l -- pectineus longior
i --- pectineus inferior
M M -- triceps komt van voren
b --- facialis of longus
z --- triceps longior
ε --- triceps twede deel
T --- semi nervosus
w --- semi membranosus
e --- vastus int
k --- cruraeus
c -- rectus
ξ ξ --- obturatur internus
4 4 -- piriformis
N --- psoas
o ---- iliacus
N° 3
y soleus
y soleus
y soleus
L buiger van de 4 klene teen
N N tibia posticus
M -- buiger van den grotten teen
A -- tibia anticus
R --- rechter van't vorste gelit den grotten teen
E -- rechter van't vorste gelit den groote 3 teens van de 4 teenden is ant twede gelit den grotten teen



de muskels der dyge sint dese
24 -- piriformis
- obturatur internus
N ---- psoas
o ---- iliacus
bb ---- facialis
- triceps longior
ε --- triceps twede gedeelte
T --- semi nervosus
M --- triceps van voren
i ---- pectineus inferior
l ---- pectineus longior
g ---- gracilis
kk ---- crureus
e --- vastus internus
r --- rectus
d --- rectus twede
w --- semi menbranosus
N° 4
L den buger der vier tehen of perforans
NN tibia posticus
M buger van erste gelit der grotten tehen
O peroneus primus
q peroneus tertius
peroneus secundus kan
men niet te sien krijgen van
deser sijde
R rechter van den grotten tehen
A tibia anticus
E rechter van de voorsten leden der
4 kleine tehen en de 4 twede
wort gesonden aen twede
gelit des grotten tehen


de dyge Musculen sint dese
l .. poctineus longior
i ... poctineus inferior
g ... gragilis
M ... tricops van voores komp
f ... lividus
N ... psoas
o ... iliacus
ÿ ... quadratus
k ... crureus
rectus
c ... rectus tweede deel
ct ct ... semi Nervosus
T ... triceps longior
ʒ ... tricops tweede god of
ε ... vastus internus
e ... facialis
ʒʒ ... obturatur internus
24 ... piriformis
W ... semi Membranosus
N 5
L L bugerder 4 tehens
NNN ... tibia postious
q -- peroneus tertius
E ... rechter van de 3 voorste leden der tehens of de 4 tendon wort gefonden aen 2 glit des grotten tehens
M - bugger des grotten tons


de dyge Muscles sint dose
vande dyge Muscles
T.. semi nervosus ~~menbranosus~~
k.. cruræus
ꝑ.. obturatur internus
p.. obturatur ex—
4.. piri formis
oo.. iliacus intern
ÿ quadratus
z.. triceps longus toja
b... facialis
i.. pectineus inferior
l... pectineus longior
g... gracilis
w semi menbranosus
N° 6




van den dyge musclen
20
ΔΔΔΔ Membra van Membranosus
a ---- het vleis Membranosus
c ---- rectus
ct ---- rectus tweede gedelte
g ---- gracilis
G
b ---- facialis of longus
99 ---- gluteus Major
T ---- semi nervosus
x ---- semi membranosus
S ---- biceps
& ---- biceps vleysigh deel
No I van dier zijde uitwaarts aengaende het been
B. rechter van 't tweede gelit der 4 tehen
A. Tibia anticus
[struck out]
C. het vleysachtige gedelte van de tehenrechter
D. rechter van de grotten tehen
E. rechter van 't eerste of vorst gelitt der tehen ... van de 4 ... niet aen de kleinen en loopt ... niet aen 't eerste gelit des grotten tehens maer vattet het tweede gelit dervan
FF gemela of gastrocnemius
G plantaris
yy solleus en sijn vleis
K tendon van solleus
o peroneus primus
PP peroneus secundus
q peroneus tercius
M buger van 't eerste gelit des grotten tehens
dese anatomie de dyen, been en voeten hebbe ic Maerten Hagemola geteykent met gedes hulpe ~~gemaect~~ met eygen handen geanatomeseert en ondersocht tehulpe hebbende lust en drift en geteykent int Jaer 1654
de banden daer bestat in 24 stucken 6 van buyten wart van ter syden te sien en 6 van inwart des beens te sien en dan 12 van voren te sien


van den dyge mussele
20
ΔΔρΔ Menbra van Menbranosus
a ...... het vleis Menbranosus
c ...... rectus
ct ...... rectus tweede gedelte
g ...... grasilis
b ...... facialis of longus
qq ...... gluteus Major
T ...... semi nervoses
x ...... semi menbranosus
S ...... biceps
& ...... biceps vleijs gedeel
No I van der syden utwarts ingaende het .. been
B rechte vant tweede gelit der 4. tehens
A . Tibia antieus
~~B rechte der tehen van 4 [illegible] grotte~~
C . het vleijsachtige gedelte van den tehen rechter
D .. rechter van den grotten tehen
E .. rechter vant erste of vorst gelitt der tehen en van de 4 ander komt niet an den kleinen en loopt en niet ant erste gelit des grotten tehens mar vatt het het tweede gelit der van
FF .. gemela .. of gastrinemius
G ... plantaris
yy ... solleus en hor vleijs
K ... tendon van solleus
o ... peroneus primus
PP ... peroneus secundus
q ... peroneus tercius
M ... buiger vant erste gelit des grotten tehens
dese anatomije der dygen, been en voten hebbe ic Marten Sagemolen geteijkent met godes hulpe ~~[illegible]~~ met eygen handen geanatomeseert en ondersocht tehulpe hebbende lust en draufheit en geteijkent int jaer 1654
de banderen dan bestat in 24 stucken 6 van buttenwart van ter syden tehesen en 6 van inwart des beens tehesen en den 12 van voren tehesen


Van den dyge Muskels
d ... rectus ex
d ... rectus ex twede deel
b ... facialis ... of longis
c ... rectus
c ... rectus twede deel
kk ... Crureus
o ... iliacus
g ... lumbus
i ... pectineus inferior
l ... pectineus ... longior
g ... gracilis
R ... gluteus medius
qq : gluteus Major
T ... semi nervosus
W ... semi membranosus
S ... biceps
& ... biceps vleysige deel
N° 2
A ... tibia anticus
K ... tendon van 60 kouus
M ... buiger van den grotten tehen
G plantaris
H poplitaeus
E ... gedeelte van gemelca
E ... rechter van de vorste lidt der
* 3 tehen als oc van 2 golit des grotte tehen
D ... rechter van't vorste golit des grotte tehen
o ... peroneus primus



Van den dyge Muskelen
d ... rectus ex
f ... rectus ex tweede deel
b ... facialis ... of longis
c ... rectus
ct ... rectus tweede deel
kk ... crureus
o ... iliacus
g ... lividus
i ... pectineus inferior
l ... pectineus ... longior
g ... gracilis
R ... gluteus medius
qq : gluteus major
T ... semi nervosus
W ... semi membranosus
S ... biceps
& ... biceps vleysige deel
N° 2
A ... tibia anticus
K ... tenden van de kuyt
M ... buyger van den grotten teen
G ... plantaris
H ... popliteus
F ... gedeelte van gemellen
E ... recheder van de vorste leden der
* 3 teenen als oock vant 2 gelit des grotten teens
D ... rechter vant vorste gelit des grotten teens
o ... peroneus primus

van der dijgemuschels

r ... rectus
c+ ... rectus tweede del

d ... vastus ex
ð vastus ex tweede del
b ... fascialis of longus
R .. glutaeus medius

S .... biceps longior
& .... biceps vleijs gedelte
y ... quadratus

ǂ ..... borsmuskel van obturator internus

24 ..... piriformis
M ... triceps kompt van voor
E ... triceps tweede gedelte
w.w . semi membranosus
T.T .... semi nervosus

k k .. cruraeus
o .... iliacus
8 .... lumbus
i ... pectineus inferior
l ... pectineus longior
g .... gracilis

N° 3

A.A tibia anticus
B --- rechter der 4 kleine tehen
K c --- gedelte van der teenrechter
D ---- rechter van den grotten teen
E rechter van de kleine tehen en van 2 lit des grotten tehen
ij soleus. har vleijs is des teidon af gedaen
M buiger van die grotten tehen
o peroneus primus

Van den dyeMusculen

♄ ... borstmuskels van obturatur internus
V ... glutaeus Minor
f ... vondeling

T ... semi nervosus
ℰ ... biceps vleyssige deel
S ... biceps longior
w w ... semi membranosus
ε ... triceps twede deel
MM ... triceps van vooren
♃ ... piriformis
ÿ ... quadratus
kk ... cruraeus
i ... pectineus inferior
l ... pectineus longior
o ... iliacus
ℊ. liuidus
g ... grazilis

de Musculen wat hir sint Nachtans ~~Nachtans~~ uit wegen wroetg sal in Natuurne Muskel als bi exempel tiba ~~of~~ anticus stuino of peroneus tertius stuino

Nº 4

A tibia anticus

H popliteus

L tendon van perforans van den buiger de vier teehen

N tibia posticus is de allerunderste

M buiger van den grotten teehen

q peroneus tertius

p peroneus secundus

D nechter van den grotte teehen

E ~~buiger~~ nechter der 4 teehen de drie vant erste of verste lit en de 4 vant 2 lit des duims


O peroneus primus — af



Van den dygem
k . cruræus
w . semi menbranosus
ʒʒ . triceps lonior
εε . triceps twede gedelte
ÿ . quadratus
4 . piri formis
P . obturatur ext. of uitwendig stopper
M.M.M. triceps komt van voren
4
P
M
M
E
ʒ
E
W
k
ʒ
M
E
9
Nº 5
E rechter vant eerste lit der tehen
M buger van den grotten tehen
9 peroneus tertius

Van de dyge muskelen

ʒ · triceps longior
ε · triceps tweede del
M · triceps van vooren
ÿ · quadratus
P · obtúratúr ext of uterlicke stoper
♃ · piri formis

Nº 6




27

iliacus

psoas

b longius
R glutius medinus
c rectus
i pectineus inferior
l pectineus
γ triceps longior
q glutaeus maior
K crureus
i vastis inter
δ vastis ex
& biceps
4 piriformis
3 obturatur intervie
24 piriformis
8 grazilis
n obturatur ext

F

F

A

o

o
P
A
B
F

y

y


P

B

N



N° 2 van de dijge
bb longus of sartorius
c ... rectus
ct rectus tweedgedeelte
d ... vastus externus
d ... vastus ex tweede de
e ... vastus internus
kk ... crureus
C ... biceps vleijsige d
g ... gracilis
ℨℨ .. triceps longior
l ... pectineus
i ... pectineus inferi
δ ... iliacus
p ... obturatus externus
y ... quadratus
RR gluteus Medius
qqq ... gluteus Major
ℨℨ ... obturatur internus
2 2 2 2 piri formis
N° 2
A tibia anticus
y y soleus
oo peroneus primus
pp peroneus secundus
q peroneus tertius
M buiger van den groten teen
C het vleijsige gedeelte der 4 teens
B N tibia posticus
LL peroneus of buiger der 4 teen
EEEE recker der 4 teens
H popliteus
F gemelo is achterwart afgedaen



om dat der buck noch vaste is an pubis en ... ilium so behouwt men de psoas als oc iliacus. item. obturator int. en piriform niet tee observeren tot an afscheiden in de 3 Nomri van voren deze bijgebonde so rechent men deze. 4 No die uit als om curiositeit ~~No 3 ... dyge~~.

van de dyge van voorten
c c. rectus
c c. rectus twede dee
g g. gragillis
b b. facialis of longus
z z z. triceps longior
k k k. cruraeus
e e. vastus int.
d d. vastus extr
d d vastus ext twede d
l l. pectineus longus
i i. pectineus inferi
g g. linidus
R R. gluteus medi
e e. biceps vleysige de
y y. quadratus
P P. uiterliche stopa of obturatus ex
z z z z. piriformis
obturatur inter
o o o. iliacus
N. psoas

N°3
A tibia anticus
E rechter der 4 teenen
c het vleysige des ... rechter
B rechter der 3 teenen dan het 2 litt en de 4 tondon gaet ... erste of vorste gelit des ... tenen
O peroneus primus
q peroneus tertius
p peroneus secundus
y y soleus
L L perforans of buiger der 4 teen
N N tibia posticus
D rechter van det erste en 2 lit des grotten teens



N° 4
van de dijgebein
δ vastus ext
γ vastus ext tweede deel
e .. vastus internus
f ... voudeling
g ... linidus
i ... pectineus inferior
l ... pectineus longus
M. triceps longus vooren van
z triceps longus
kk .. crureus
ε ... biceps velijbige deel
v ... gluteus minor
P .. uterliche stoper
ÿ ... quadratus
24 24 . piriformis
ʒʒ .. obturatus intern
o o
N
N° 4
A tibia anticus
E rechter der 4 tehens
r het vleijsachtige gedeelte des tehens jesterus
D ... rechter des grotes tehens
p .. peroneus secundus
q .. peroneus tertius
M .. buiger des grotes tehens
NN . tibia posticus is de aler onderste
LL peroneus of buiger der 4 tehen
6666 .. rechter der 13 tehens en den kleijnen tehen vattende het vorste ofte erste gelit
o .. peroneus primus



N° 5
van der dyjen
f .. vondeling
g .. linidus
i .. pectineus inferior
l .. pectineus .. longior
N .. psoas
M .. triceps hoeft van voren
z .. triceps. longus
w .. semi membranosus
k k .. crureus
e .. biceps vleijsighe dele
o o .. illiacus
.... inerliche stopper of obturatus internus
24 24 piri formis
r .. rectus
N° 5
A tibia anticus
B rechter der 2 geliden der 3 tehen en in den kleinen tehen is sie in vorste glitt
c het vleijsige gedelte der tehenrechters
P peroneus secundus
O peroneus primus
q peroneus tertius
M buiger van den grotten tehen
NN tibia posticus ist de underste
L L perforatus of tehen buiger
DD rechter van den grotten tehen vant eerste en 2 gelit
E rechter 4 tehen in den kleinen tehen en wer gen ter den van her gesneden


N° 6
N . psoas
l . pectineus longus
MMM . triceps
tricepes longior
oo iliacus
obturatur internus
piri formis
N° 6
peroneus
tibia posticus

No 7
van der dyjen

E . triceps twede gedeelt
z . ... triceps longior
MMM . triceps hoomptder vooren
o o . . jliacus
N . . psoas
w . . semi membranosus
l l . . pertinens longior
e . . biceps vleysigheit
+ +++ piriformis
§ § . . . obturatus internus
obturatus ex

Nᵃ 8
van der dyijen

w. semi menbranosus
ʒ. triceps longior
E. triceps tweede gedeel
MM .. triceps van vooren
P. uiterliche stopper of obturatur externus
ÿ - - quadratus

o o .. illiacus

N. psoas
ʒ. obturatur internus innerlicher stopper
♃ piri formis
8 biceps vleysig gedeelte


No. 9
van der dyen
w. semi Membranosus
z. triceps longior
ε. triceps tweede gedelte
s. biceps longus
c. biceps vleysig gedelt
y. quadratus
p obturatur ext



4
5
No 10
van der dijgen
ϱ. biceps derijsge gedeel
w.w. semi membranosus
ʒ. triceps longus
ε. triceps tweede gedee
ÿ. quadratus
si biceps longior



Nº ii
van der dyen
S. biceps longior
& biceps vleyssige gedelte
w w. semi menbranosus
z z. triceps longus
ε. triceps tweede gedelte

Nº XII
van der dyen

W semi Membranosus
T T semi Nervosus
S biceps longior
E biceps vleisig delta

in deese antomye hebbe ic gelic ic niet beter en weet driederleij konstenaren sochen te voldoen
voor eerst voor all den hoogen geleerden Min heren Johannes van hoorne ~~[illegible]~~: daer na den ~~de andere~~ oc
de antomische konstenaren - - als oc alle ~~[illegible]~~ liefhebbers der selver: daer na dan de botte en
stumpen schilders wellek wel weetgirich sint maer willen davan geen handen an de
ploegh sclaen: daer na en ten derden den hooghdravenden meest ~~[illegible]~~verstandigen beltsnijders
en steenhouwers waeren wel — gesphinen in den kloppertit dont tot ~~[illegible]~~
: nortwich kermiss was en sondachs doen ic hade gehacht bit urglass bekans an
leijdens ent





N.o 3

y
L
N
M
G

Martes Pagemoles jnfomit 1560

N°. 4

5.
7.
8.
11.
3.

M.
N.
L.


Marten Sagemolen invenit 1660



N° 5
N N
M
Marten Sagemol
invenit 1.6.60

N°6

NN

Martes Sagemoles· jnvenit 1660





N°. 2

jlium et os sacrum et rotula

g.
G.
G.
43.
9.
G.
46.

g.

tybia et perone

E
O
P
C
D
A
F.
ÿ
B
α.

Martis pagemolis jnvenit
...l. 3. Anno. 16. 60

N.° 3

femori et trochanter Major et tuberculum

46 .
P .
48 .
G .
59 .
06 .
53 .
G .
A .
Z .
4 .
G .
51 .
G .


tibia et peroni et pedi

G .
H .
y .
P .
C .
D .
E .
O .
a .

Martes agemoks invenit

n°. 4

femori et pubis ilium pub.s



perone et piedi

q.
M.
N.
L.
E.
a.

Marti: Sagemolen Infenit

N°.5


pubis et femori

53 .
58 .
06 .
59 .
x

peroni et pedi

M .
E .
a .

Martis Jagemolis Invenit




N°. 2

femori et iliium


8 ·
9 ·
5 ·
7 ·
52 ·
5 ·
4 ·
13 ·
43 ·

tibialis et peroneus

N
M
L
B
Ÿ
F
S
P



N°. 2
55
femori et ilium
8
13
43
F
G
F
F
B
B
B
B
N
L
N
tibialis et peroneus
N
M
L
B
Ÿ
F
G
P



N° 4



tibia van achter

H poplitaeus
N tibia posticus
L perforans of buygerder 4 van | leden da tegen
ÿ soleus
P peronaeus secundus
q peronaeus tertius
O peronaeus primus
G plantaris
F gimela
E nechter van wortge gelede der 4 tohen
B nechterder 4 tohen des 2 lith
C het vleijsige deel des tohen nechter
M buyger der grotte tohens

A tibia anticus
D nechter van der grotte tohen

femori van achter
[illegible] ~~[illegible]~~ biceps carne
[illegible] biceps
7 triceps longior
[illegible] ~~[illegible]~~ psoas
[illegible] quadratus
[illegible] triceps medius
[illegible] triceps brevis
[illegible] pectineus longior
[illegible] lividus
[illegible] iliacus
[illegible] vastus internus
[illegible] crureus
[illegible] gluteus medius
[illegible] glutaeus minor
[illegible] piriformis
[illegible] borp mussel
[illegible] obturatur internus
[illegible] obturatus ext
[illegible] gluteus Major
[illegible] semi membranosus
[illegible] semi nervosus
44 membranosus musclus
45 facialis
46 rectus femori

[illegible] obliqus ext:
[illegible] obliqus inter:
[illegible] transversus
2 latissimus
□ quadratus
L sacro lombus inferior
K sacro lumbus exterior
M dorsi longissimus

~~[illegible]~~

dite sijnt de muskelletters welche angewesen sijn op den beenders van achter welcke bestaen in 9 nomen of stucke

M. Sagemolen Invenit
1660

N°4

Nota dit Zampier behoort tot de 2. onderste met het
Tafelle No. 10. getekent. de 2 tafelen zijn N° 10. en N° 9

femori et tuberculum

N
L
P
o
7.

M. Sagomolas Invenit
1660

N°4



os femori et tuberculum

9 .
H .
8 .
G .
A .

os tibia et peroneus

M
N
L
P
o
q.

M. Pagomolas Invenit
1660

N°. 5



S. femori et tuberculum


x


S tibia et perone

q.
P.
N
E

M. Sagemol invenit
16.60


N°6
+ os tuberculum et os sacrum
x . trocantor minor
os tibia et perone et pedija de
sonia
M. Sagemol invenit
1660






N° 3

59 ·
06 ·
53 ·
G ·
7 ·
G ·
48 ·
46 ·
S ·
67 ·
6

H ·
E ·
D :
C ·
L ·
N ·
P ·
Y ·

invenit · 15 · 60





No 2
dese anatomiserde armen hebe
ic Marten Hagemolen uit verscheyden
Mensen under socht en geanatomiseert
met groter kostung en Moyten doch
dat met so geern Anno 1634



N°3
N°4


N.° 4


N° 54


No 6


N° 7
N° 8
N° XI





N° 4
N°. 2



Nº 5
Nº 3.



n° 6


N°. 4.


N° 8
N. 5.


N° 9
anconeus ist geheel vander weck
Nervus supinator moet men als vervens
doppelt te wesen want hy kompt van
den cubiti an der inwarttige kant vande
muskel brachieus internus en gat het
by radius om winden tot an biceps
het tweede dobbel is het
kleynste en kompt van der buyten
uytstoten humeri en plaat hy X wiss
over de verscyden en is en getrocken
de ander is en aendraeyen
N° 6.

